



**Der Stachelbeer-
strauch mit großer
rother Frucht**
Ribes grossularia
fructo rotundo maximo

Synonyme:

Groselbeeren, Christohrenbeere.
Stechdorn. Rothe Stachelbeere.

Der Stachelbeerstrauch mit großer rother Frucht.
Ribes grossularia, fructu rubro rotundo
maximo.

Groselbeere. Christohrenbeere. Stechdorn. Rothe
Stachelbeere.

Eine Varietät von dem gemeinen Stachelbeerstrauch.
Die Blüthe erscheint Ende des Aprils, und die Beeren
reifen Anfangs Junius; und werden nur bloß in den
Gärten erzogen. Es giebt noch viel mehr Abarten,
welche aus den Saamen erzeugt und in die Pflanz-
schulen unterhalten werden. Die Frucht ist groß,
roth und hat einen süßen angenehmen Geschmack.
Ubrigens hat er mit dem Gemeinen Stachelbeer-
strauch alles gemein.

I. Ein Zweig mit Blättern und reifen Beeren. II. Die
Beschreibung. III. Der Saame zur Saat. IV. Die
Zwitterblüthe. V. Das junge Pflänzchen. VI. Ein senk
und wagrecht durchschnittener Ast. VII. Die Thau-
Saug- oder Faserwurzel. VIII. Einen 1/8 Cubiczoll aus
dem Herzholze zur Prüfung des spezifischen Gewichts.
IX. Die Asche.

DER STACHELBEERSTRAUCH MIT
GROßER ROTHER FRUCHT
Ribes grossularia fructu rubro rotundo maximo.

Groselbeeren, Christohrenbeere. Stechdorn. Rothe
Stachelbeere.

Eine Varietät von den gemeinen Stachelbeerstrauch.
Die Blüthe erscheint Ende des Aprils, und die Beeren
reifen Anfangs Junius; und werden nur bloß in den
Gärten erzogen. Es giebt noch viel mehr Abarten,
welche aus den Saamen erzeugt und in den
Pflanzschulen unterhalten werden. Die Frucht ist groß,
roth und hat einen süßen angenehmen Geschmack.
Übrigens hat er mit dem Gemeinen Stachelbeerstrauch
alles gemein.

I. Ein Zweig mit Blättern und reifen Beeren. II. Die
Beschreibung. III. Der Saame zur Saat. IV. Die
Zwitterblüthe. V. Das junge Pflänzchen. VI. Ein senk
und wagrecht durchschnittener Ast. VII. Die Thau-
Saug- oder Faserwurzel. VIII. Einen 1/8 Cubiczoll aus
dem Herzholze zur Prüfung des spezifischen Gewichts.
IX. Die Asche.

