

Die Trauben- Flühhirn

Mespilus canadensis

Synonyme:

Keine Angaben

Buch nicht vorhanden, nur Beschreibung

Trauben-Äpfelbirn. *Mespilus Canadensis* Linn.

Sie ist in Nordamerika heimisch, wird aber in Deutschland fast in allen Lustgebüschern gefunden. Die Rinde des Stammes ist glatt und bräunlich; die Zweige sind glatt, rothbraun und rund. Die Blätter, welche an über 1/4 Zoll langen, glatten, in der Jugend weißbehaarten Stielen stehen, sind länglich elliptisch, am Grunde leicht herzförmig verlängert. Die Blüten erscheinen im Mai an den Spitzen der jungen Zweige. Die Früchte sind bläulich schwarz, von der Größe einer Johannisbeere. Das Holz dieses Baumes ist weiß, sehr zähe, und fest, und dient daher zu allerlei Nutzverbrauche.

I. Ein Zweig mit Blättern und reifen Beeren. II. Die Beschreibung. III. Der Saame zur Saat. IV. Die Zwitterblüthe. V. Das junge Pflänzchen. VI. Ein senk und wagrecht durchschnittener Ast. VII. Die Thausaug- oder Faserwurzel. VIII. Einen 1/4 Cubiczoll aus dem Herzholze zur Prüfung des spezifischen Gewichtes.

TRAUBEN-FLÜHBIRN
Mespilus Canadensis Linn.

Sie ist in Nordamerika heimisch, wird aber in Deutschland fast in allen Lustgebüschern gefunden. Die Rinde des Stammes ist glatt und bräunlich; die Zweige sind glatt, rothbraun und rund. Die Blätter, welche an über 1/4 Zoll langen, glatten, in der Jugend weißbehaarten Stielen stehen, sind länglich elliptisch, am Grunde leicht herzförmig verlängert. Die Blüten erscheinen im Mai an den Spitzen der jungen Zweige. Die Früchte sind bläulich schwarz, von der Größe einer Johannisbeere. Das Holz dieses Baumes ist weiß, sehr zähe, und fest, und dient daher zu allerlei Nutzverbrauche.

I. Ein Zweig mit Blättern und reifen Beeren. II. Die Beschreibung. III. Der Saame zur Saat. IV. Die Zwitterblüthe. V. Das junge Pflänzchen. VI. Ein senk und wagrecht durchschnittener Ast. VII. Die Thausaug- oder Faserwurzel. VIII. Einen 1/4 Cubiczoll aus dem Herzholze zur Prüfung des spezifischen Gewichtes